

Инструкции по применению и основные характеристики отдельных вакцин

Актуальные инструкции распечатаны и вложены в упаковку каждой вакцины

В таблице главным образом приведены инструкции, размещенные в Реестре лекарственных средств Республики Беларусь (в ряде случаев – на иных ресурсах, что указано дополнительно)

Схему вакцинации конкретного ребенка определяет врач, с учетом инструкций по применению, рекомендаций Национального календаря профилактических прививок, рекомендаций по догоняющей вакцинации, возможностей сочетания нескольких вакцин, и других обстоятельств

Перечень вакцин приведен в алфавитном порядке

Дата составления таблицы: 30.06.2026

Вакцина (производитель)	От каких инфекций защищает	Для кого предназначена	Схемы вакцинации (УТОЧНЯЙТЕ СХЕМЫ У ВАШЕГО ВРАЧА!)	Ссылки на инструкции по медицинскому применению*
Абрисво (Pfizer, Ирландия)	Респираторно- синцициальная (РСВ) инфекция	Взрослым с 18 лет и пожилым. Беременным между 24 и 36 неделями (для защиты новорожденного)	Однократно. Беременным – при одной из беременностей	Инструкция: пациента специалиста
Адасель (Sanofi Pasteur, Франция)	Коклюш (бесклеточный), дифтерия, столбняк	Детям с 4 лет и взрослым. Беременным во 2 и 3 триместре (для защиты новорожденного)	Схема зависит от предыдущих прививок. Бустерные дозы в 6 и 16 лет, затем каждые 10 лет. Беременным – при каждой беременности	Инструкция: пациента специалиста
Альгавак М (Вектор- БиАльгам, Россия)	Гепатит А	Доза 1,0 мл: взрослым и подросткам с 16 лет. Доза 0,5 мл: детям от 3 до 16 лет	2 дозы с min интервалом 6 месяцев	Инструкция (реестр лекарственных средств РФ, РУ № Р N000461/01 от 26.09.2018): специалиста
Бексеро (GlaxoSmithKline, Италия)	Менингококковая инфекция серогруппы В	Детям с 2 месяцев, подросткам и взрослым до 25 лет	Детям до 2 лет – 3 дозы (интервалы между дозами зависят от возраста), в возрасте ≥2 лет – 2 дозы с min интервалом 1 месяц	Инструкция (реестр лекарственных средств ЕАЭС, ЛП-№(000713)-(РГ- RU) от 11.03.2025): пациента
Варилрикс (GlaxoSmithKline, Бельгия)	Ветряная оспа	Детям с 1 года, подросткам и взрослым	2 дозы с min интервалом 6 недель	Инструкция: пациента специалиста
Варицелла (Sinovac, Китай)	Ветряная оспа	Детям с 1 года, подросткам и взрослым	2 дозы с min интервалом 6 недель**	Инструкция (реестр преквалифицирован- ных вакцин ВОЗ, *** от 03.11.2022): пациента

Вакцина (производитель)	От каких инфекций защищает	Для кого предназначена	Схемы вакцинации (УТОЧНЯЙТЕ СХЕМЫ У ВАШЕГО ВРАЧА!)	Ссылки на инструкции по медицинскому применению*
Гардасил (Merck, Нидерланды)	Вирус папилломы человека (4 серотипа ВПЧ, защита от рака, папиллом и кондилом)	Девочкам и мальчикам с 9 лет, подросткам и взрослым.	Детям 9-13 лет – 2 дозы с min интервалом 6 месяцев, подросткам ≥15 лет и взрослым – 3 дозы (по схеме 0-2-6 месяцев)	Инструкция: пациента специалиста
Гардасил 9 (Merck, Нидерланды)	Вирус папилломы человека (9 серотипов ВПЧ, защита от рака, папиллом и кондилом)	Девочкам и мальчикам с 9 лет, подросткам и взрослым	Детям 9-13 лет – 2 дозы с min интервалом 6 месяцев, подросткам ≥15 лет и взрослым – 3 дозы (по схеме 0-2-6 месяцев)	Инструкция (реестр лекарственных средств ЕАЭС, ЛП-№012985-РГ-KZ от 23.01.2026): пациента специалиста
Гексаксим (Sanofi Pasteur, Франция)	Коклюш (бесклеточный), дифтерия, столбняк, полиомиелит (ИПВ), гепатит В, гемофильная инфекция типа b (Хиб)	Детям с 6 недель до 18 лет	Детям в 2, 3, 4 и 18 месяцев (или в другие сроки при догоняющей вакцинации)	Инструкция (1): пациента специалиста Инструкция (2): пациента специалиста
Инфанрикс (GlaxoSmithKline, Бельгия)	Коклюш (бесклеточный), дифтерия, столбняк	Детям от 2 месяцев до 7 лет	Детям в 2, 3, 4 и 18 месяцев (или в другие сроки при догоняющей вакцинации)	Инструкция: пациента специалиста
Инфанрикс Гекса (GlaxoSmithKline, Бельгия)	Коклюш (бесклеточный), дифтерия, столбняк, полиомиелит (ИПВ), гепатит В, гемофильная инфекция типа b (Хиб)	Детям до 18 лет	Детям в 2, 3, 4 и 18 месяцев (или в другие сроки при догоняющей вакцинации)	Инструкция: пациента специалиста
Клещ-Э-Вак (Институт им. Чумакова, Россия)	Клещевой энцефалит	Доза 0,25 мл: детям от 1 года до 16 лет. Доза 0,5 мл: взрос- лым и подросткам с 16 лет	2 дозы с интервалом от 1 до 7 месяцев (или 2 недели по ускоренной схеме), затем одна доза через 12 месяцев, и далее каждые 3 года	Инструкция: пациента специалиста
Менактра (Sanofi Pasteur, Франция)	Менингококковая инфекция серогрупп ACWY	Детям с 9 месяцев, подросткам и взрослым до 55 лет	Детям в 9 и 12 месяцев (или в другие сроки при догоняющей вакцинации). Детям ≥2 лет и взрослым – однократно	Инструкция: пациента специалиста
МенКвадфи (Sanofi Pasteur, США)	Менингококковая инфекция серогрупп ACWY	Детям с 6 недель, подросткам и взрослым	Детям в 2, 4 и 12 месяцев (или в другие сроки при догоняющей вакцинации). Детям ≥1 года и взрослым – однократно	Инструкция: пациента специалиста
Нименрикс (Pfizer, Бельгия)	Менингококковая инфекция серогрупп ACWY	Детям с 6 недель, подросткам и взрослым	Детям в 2, 4 и 12 месяцев (или в другие сроки при догоняющей вакцинации). Детям ≥2 лет и взрослым – однократно	Инструкция: пациента специалиста

Вакцина (производитель)	От каких инфекций защищает	Для кого предназначена	Схемы вакцинации (УТОЧНЯЙТЕ СХЕМЫ У ВАШЕГО ВРАЧА!)	Ссылки на инструкции по медицинскому применению*
Превенар 13 (Pfizer, Бельгия)	Пневмококковая инфекция (13 серотипов)	Детям с 6 недель, подросткам и взрослым	Детям в 2, 4 и 12 месяцев (или в другие сроки при догоняющей вакцинации). Детям ≥2 лет, подросткам и взрослым – однократно	Инструкция: пациента специалиста
Превенар 20 (Pfizer, Ирландия)	Пневмококковая инфекция (20 серотипов)	Детям с 6 недель, подросткам и взрослым	Детям в 2, 3, 4 и 12 месяцев (или в другие сроки при догоняющей вакцинации). Детям ≥2 лет, подросткам и взрослым – однократно	Инструкция: пациента специалиста
Рота-V-Эйд (Serum Institute, Индия)	Ротавирусная инфекция	Детям с 6 недель (завершить до возраста 24 месяцев)	3 дозы с min интервалами 4 недели	Инструкция (реестр лекарственных средств ЕАЭС, ЛП- №(007440)-(РГ-RU) от 29.10.2024): пациента специалиста
РотаТек (Merck, Нидерланды)	Ротавирусная инфекция	Детям с 6 недель (завершить до возраста 32 недели)	3 дозы с min интервалами 4 недели	Инструкция: специалиста
Тетраксим (Sanofi Pasteur, Франция)	Коклюш (бесклеточный), дифтерия, столбняк, полиомиелит (ИПВ)	Детям с 2 месяцев до 13 лет	Схема зависит от предыдущих прививок. Бустерная доза детям в 6-7 лет (одна прививка вместо двух: вместо Адасель в 6 лет и ИПВ в 7 лет)	Инструкция: пациента специалиста
Тиковак Джуниор (FSME-Immun Junior) (Pfizer, Австрия/ Бельгия)	Клещевой энцефалит (детям)	Доза 0,25 мл: детям от 1 года до 16 лет	2 дозы с интервалом от 1 до 3 месяцев (или 2 недели по ускоренной схеме), затем одна доза через 5-12 месяцев, через 3 года и далее каждые 5 лет	Инструкция: пациента специалиста
Тиковак (FSME-Immun) (Pfizer, Австрия/ Бельгия)	Клещевой энцефалит (взрослым)	Доза 0,5 мл: взрослым и подросткам с 16 лет	2 дозы с интервалом от 1 до 3 месяцев (или 2 недели по ускоренной схеме), затем одна доза через 5-12 месяцев, через 3 года и далее каждые 5 лет (лицам старше 60 лет – каждые 3 года)	Инструкция: пациента специалиста
Тривэйд (Serum Institute, Индия)	Корь, паротит, краснуха	Детям с 1 года, подросткам и взрослым	Детям в 1 и 6 лет. При догоняющей вакцинации: 2 дозы с min интервалом 1 месяц	Инструкция (реестр лекарственных средств ЕАЭС, ЛП- №(012733)-(РГ-RU) от 05.12.2025): специалиста
Труменба (Pfizer, Ирландия)	Менингококковая инфекция серогруппы В	Детям с 10 лет, подросткам и взрослым	2 дозы с min интервалом 6 месяцев	Инструкция: пациента специалиста

Вакцина (производитель)	От каких инфекций защищает	Для кого предназначена	Схемы вакцинации (УТОЧНЯЙТЕ СХЕМЫ У ВАШЕГО ВРАЧА!)	Ссылки на инструкции по медицинскому применению*
Хаврикс (GlaxoSmithKline, Бельгия)	Гепатит А	Доза 0,5 мл: детям с 1 года до 16 лет. Доза 1,0 мл (или 2 дозы по 0,5 мл): взрослым и подросткам с 16 лет	2 дозы с min интервалом 6 месяцев	Инструкция: пациента специалиста
ЭнцеВир (Микроген, Россия)	Клещевой энцефалит (взрослым)	Доза 0,5 мл: взрослым и подросткам с 18 лет	2 дозы с интервалом от 1 до 7 месяцев (или 2 недели по ускоренной схеме), затем одна доза через 12 месяцев, и далее каждые 3 года	Инструкция: пациента специалиста
Эувакс В (LG Chem, Корея)	Гепатит В	Доза 0,5 мл: детям с 1 года до 16 лет. Доза 1,0 мл: взрослым и подросткам с 16 лет	При догоняющей вакцинации: 3 дозы по схеме 0-1-6 месяцев. Или иная схема в случае использования комбинированных вакцин	Инструкция: специалиста

Примечания: *если не указано иное, то приведены инструкции, размещенные в [Реестре лекарственных средств Республики Беларусь](#);

**схема вакцинации согласно [рекомендациям](#) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2025 года;

***преквалификация Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) – это процедура оценки качества, безопасности и эффективности вакцин, гарантирующая их соответствие мировым стандартам. Список преквалифицированных ВОЗ вакцин и их производителей можно увидеть [здесь](#).

[Прейскурант цен на вакцины для граждан Беларуси](#)

[Прейскурант цен на вакцины для иностранных граждан](#)

Уточнить наличие вакцин, их цены и записаться на вакцинацию можно по телефонам:

+375 17 265 18 08, +375 44 553 36 06



Мы в Телеграм:

